

# CONSUMO DE DROGAS EN ARGENTINA: TENDENCIAS Y DESAFIOS


Cont. Gustavo Segnana  
Coordinador de Financiamiento Internacional  
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007

# Estructura

- Uso de sustancias psicoactivas
- Clasificación según su estructura legal
- Situación general de consumo – Marco global
- Situación de consumo en países latinoamericanos
- Ultimos estudios desarrollados en Argentina ( generales en hogares y escolares)
- Niveles de prevalencia año-mes, factores de protección, factores de riesgo-tolerancia social al uso, abuso.
- Relevancia estructural por tipo de sustancia, por rango etáreo. Variaciones entre períodos.
- Tratamiento: caracterización, perfiles
- Uso de sustancias y su vinculación con delitos y accidentes
- Gastos gubernamentales
- Reflexiones y desafíos


# Conceptualización y tipificación

Sustancia psicoactiva: toda sustancia natural o sintética que introducida al organismo vivo de cualquier forma puede modificar una o más funciones de éste (definición clásica de la OMS)



# Contexto global


## Consumo de drogas ilícitas a nivel mundial (2004)



Fuente: Reporte 2006 Naciones Unidas

# Contexto Global


**Fig. 1a: El consumo de drogas ilícitas comparado con el consumo de tabaco (porcentaje de la población mundial de 15 a 64 años de edad)**



Fuente: Reporte 2006 Naciones Unidas


## Contexto Global - Prevalencia marihuana último año en población adulta joven ( 15-24 y 15-34 años).

Gráfico 2. Prevalencia del consumo de cannabis entre la población adulta joven (entre 15 y 34 años y entre 15 y 24 años) durante el último año




Fuente: EMCDDA

# Marihuana: Prevalencia último año en población de 15-64 años




Fuente: Reporte 2006 Naciones Unidas

# Prevalencia cocaína último año en población general ( 15-64 años) y en jóvenes ( 15-24 y 15-34 años).




Fuente: EMCDDA

# Cocaína: Prevalencia último año población 15-64 años




Fuente: Reporte 2006 Naciones Unidas

# Tendencias en prevalencia año: población de 12 y más años en Estados Unidos.




Fuente: SAMHSA, reporte 2006

# Tendencia en precios minoristas por sustancia




Fuente: EMCDDA

## Contexto regional: prevalencia mes de tabaco en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia mes de tabaco en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia mes de alcohol en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia mes de alcohol en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencias año de marihuana en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de cocaína en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de pasta base en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de inhalables en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de tranquilizantes sin prescripción médica en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de estimulantes sin prescripción médica en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de marihuana en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de pasta base en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de cocaína en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de inhalables en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de estimulantes sin prescripción médica en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: prevalencia año de tranquilizantes sin prescripción médica en estudiantes nivel medio de 14 o menos años en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: percepción de gran riesgo frente al uso frecuente de marihuana y prevalencia mes en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: ofrecimiento directo de marihuana durante los últimos 30 días y prevalencia mes en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: estructura de consumo de drogas en función de la cantidad de sustancias utilizadas en el último año en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos




Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Contexto regional: estructura de consumo de drogas en función del tipo de sustancias utilizadas en el último año en estudiantes nivel medio en países latinoamericanos



Fuente: Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria - 2006

## Argentina: estructura de consumo de drogas por edad en función de la cantidad de sustancias utilizadas en el último año en estudiantes nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

# Aspectos relevantes

La situación de nuestro país en el marco del contexto regional indica:


- En cuanto a sustancias legales se muestra en un segundo lote de países consumidores, reflejando comportamientos similares en toda la estructura etárea.
- Se ubica en niveles elevados de consumo para cocaína, marihuana, pasta base e inhalables
- Las prevalencias año para estas sustancias son de las más altas en el rango de 14 o menos años.
- Es el país con menor registro de monoconsumo y el segundo en importancia para consumo de cuatro o más sustancias, situación que se ve acentuada en 14 años o menos, donde 1 de cada 4 estudiantes declara haber registrado ese policonsumo

## Argentina: uso de marihuana según consumo de alcohol o tabaco por sexo en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: uso de cocaína según consumo de alcohol o tabaco por sexo en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: uso de alcohol según tipo de bebida consumida en el último mes por sexo en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: frecuencia en uso de alcohol según tipo de bebida consumida en el último mes en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Consumo de cerveza según sexo (sobre el total de estudiantes que bebieron cerveza en el último mes: 291.590)




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: dimensión escolar y consumo de cualquier droga ilícita en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: expectativas y consumo de cualquier droga ilícita en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: nivel de atención de los padres y consumo por tipo de droga en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

## Argentina: percepción de nivel de facilidad de acceso por tipo de droga en estudiantes de nivel medio




Fuente: Segunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005

# Evolución de la prevalencia de uso de tabaco y alcohol, según sexo. Años 2001 y 2005




Fuente: Encuestas nacionales a estudiantes de enseñanza media 2001 y 2005

## Evolución de la prevalencia de uso de marihuana y cocaína, según sexo. Años 2001 y 2005




Fuente: Encuestas nacionales a estudiantes de enseñanza media 2001 y 2005

# Evolución de la prevalencia de uso de tranquilizantes y estimulantes, según sexo. Años 2001 y 2005



Fuente: Encuestas nacionales a estudiantes de enseñanza media 2001 y 2005

# Evolución de la prevalencia de año de pasta base de cocaína e inhalantes, según sexo. Años 2001 y 2005




Fuente: Encuestas nacionales a estudiantes de enseñanza media 2001 y 2005

## Variaciones porcentuales en prevalencia año de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de nivel medio 2001-2005

Sustancias psicoactivas	Rangos de edad			
	14 o menos	15-16	17 o más	Total
Tabaco	-14.2	-4.7	-3.1	-7.4
Alcohol	-35.9	-10.0	1.5	-17.7
Tranquilizantes sin prescripción	23.8	-11.1	-1.9	6.1
Estimulantes sin prescripción	61.5	16.7	36.0	44.4
Solventes e inhalables	425.0	440.0	237.5	380.0
Marihuana	150.0	65.9	32.9	67.6
Pasta base	400.0	114.3	100.0	200.0
Cocaína	171.4	130.0	35.0	120.0


Fuente: Encuestas nacionales a estudiantes de enseñanza media 2001 y 2005

## Argentina: uso de marihuana según consumo de alcohol o tabaco por sexo en población de 12 a 65 años - 2006



Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años- 2006

## Argentina: uso de cocaína según consumo de alcohol o tabaco por sexo en población de 12 a 65 años - 2006



Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años- 2006

## Prevalencia (%) de consumo anual de marihuana según EBBA positivo y negativo por sexo y edad en población de 12 a 65 años - 2006

EBBA	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
EBBA positivo	27.8	37.2	30.9
EBBA negativo	9.4	9.5	9.4

	Grupo de Edad				
	12 a 17	18 a 24	25 a 34	35 a 49	50 a 65
EBBA positivo	34.1	23.5	37.5	32.2	29.4
EBBA negativo	16.9	13.2	11.4	6.5	6.5

Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años- 2006

## Prevalencia (%) de consumo anual de cocaína según EBBA positivo y negativo por sexo y edad en población de 12 a 65 años - 2006

	Sexo		
	Varones	Mujeres	Total
<b>EBBA positivo</b>	11.9	20.2	14.6
<b>EBBA negativo</b>	2.9	2.9	2.9

EBBA	Grupo de Edad				
	12 a 17	18 a 24	25 a 34	35 a 49	50 a 65
<b>EBBA positivo</b>	16.1	9.0	17.4	19.4	13.2
<b>EBBA negativo</b>	4.4	3.8	3.0	2.6	2.2

Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años- 2006

# Hacia donde debemos apuntar

- *El **alcohol** es la droga de mayor consumo en nuestro país*
- *Es responsable de una gran proporción de enfermedades y muertes y de demanda de tratamiento*
- *Se verifica una alta vinculación con el consumo de drogas ilegales*
- *En jóvenes escolarizados, lo lidera el consumo de cerveza y bebidas fuertes, principalmente los fines de semana*
- *En el caso de cerveza, 7 de cada 10 declara tener un consumo abusivo.*
- *En el ámbito de las drogas ilegales, se observa un importante crecimiento, con mayor fuerza en población muy joven*
- *Se observa claramente la necesidad de fortalecer factores protectores*

## Demanda de tratamiento en el último año total y por estructura etárea en población entre 12 y 65 años – Año 2006

	Cantidad de casos	Porcentaje
<b>Si</b>	205.118	1,7
<b>No</b>	12.089.588	98,3
<b>Total de consumidores</b>	12.294.705	100

	Grupo de Edad				
	12 a 17	18 a 24	25 a 34	35 a 49	50 a 65
<b>Buscó tratamiento</b>	1.1	1.1	2.1	1.6	1.9

Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años- 2006

## Accesibilidad a tratamiento total y por estructura etárea en población de 12 a 65 años - 2006

	Cantidad de casos	Porcentaje
<b>Si, está actualmente</b>	64.521	31,5
<b>Si, estuvo alguna vez</b>	90.028	43,9
<b>Nunca estuvo</b>	50.569	24,7
<b>Total</b>	205.118	100

	Grupo de Edad				
	12 a 17	18 a 24	25 a 34	35 a 49	50 a 65
<b>Está actualmente</b>	38.1	64.1	39.1	17.9	21.3
<b>Estuvo alguna vez</b>	15.1	33.1	33.5	56.7	52.2
<b>Nunca estuvo</b>	46.8	2.7	27.4	26.5	26.5
<b>Total</b>	100	100	100	100	100

Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años- 2006

# Pacientes en tratamiento por edad y sexo – Año 2005

Edades	Casos	%	% acumulado
Hasta 14	96	4.2	4.2
15 a 19	562	24.4	28.6
20 a 24	474	20.6	49.2
25 a 29	328	14.3	63.5
30 a 34	221	9.6	73.1
35 a 39	180	7.8	80.9
40 o más	440	19.1	100.0
Total	2.301*	100.0	

Sexo	Casos	%
Varones	1894	82.0
Mujeres	416	18.0
Total	2.310*	100.0

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

## Distribución de los pacientes con policonsumo según sustancias principales (agrupadas) y sexo.

Principales sustancias	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Alcohol	34.8	33.5	34.6
Tabaco	4.6	9.0	5.4
Solventes o inhalables	5.2	6.4	5.4
Cannabis	30.3	15.3	27.7
Cocainas	21.5	15.3	20.4
Tranquilizantes	3.5	20.5	6.5
Total	100	100	100

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

## Distribución de los pacientes con policonsumo según sustancias principales (agrupadas) y edad

Principales sustancias	Tramo de edad						
	menos de 14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40 o mas
Alcohol	22.5	17.1	21.5	32.9	29.8	46.4	70.0
Tabaco	2.8	4.5	5.9	4.8	4.2	8.6	5.9
Solventes o inhalables	38.0	12.8	1.9	2.1	1.0	0.7	0.0
Cannabis	29.6	43.8	44.1	25.7	19.4	11.3	3.2
Cocaínas	5.6	18.3	22.6	30.1	38.7	24.5	7.4
Tranquilizantes	1.4	3.5	4.0	4.5	6.8	8.6	13.5
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

# Indicadores estadísticos de la edad de inicio de consumo de la droga de inicio según tipo de droga

Tipo de droga de inicio	Edad de inicio			
	Media aritmética	Mediana	Modo	Desviación Estándar
Alcohol	16	15	15	6
Tabaco	14	14	14	4
Solventes	12	12	11	3
Cannabis	15	15	15	3
Cocainas	19	18	18	6
Tranquilizantes	23	20	16	11

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

# Promedio de edad de pacientes en tratamiento por tipo de droga de inicio

Droga de inicio	Promedio de edad del entrevistado
Alcohol	31.6
Tabaco	26.9
Solventes o inhalables	18.1
Cannabis	23.1
Cocainas	29.2
Tranquilizantes	39.0

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

## Porcentaje de pacientes que habiendo consumido las sustancias como droga de inicio la identifican como droga de mayor daño

	Varones	Mujeres	Total
Alcohol	56.7	58.8	56.8
Tabaco	7.1	14.4	8.6
Solventes o inhalables	52.1	(*)	54.7
Cannabis	38.7	41.7	38.7
Cocaínas	87.6	(*)	73.1
Tranquilizantes	54.5	77.1	78.2

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

# Distribución de los pacientes por sexo según tipo de droga que motiva el tratamiento

Tipo de droga que motiva el tratamiento	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
Alcohol	32.8	30.6	32.4
Tabaco	1.3	4.1	1.8
Solventes o inhalables	5.1	7.1	5.4
Cannabis	28.4	14.8	26.0
Cocaínas	26.3	19.1	25.0
Tranquilizantes	4.6	19.9	7.3
Otras drogas	1.5	4.4	2.0
Total	100	100	100


Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

# Distribución de los pacientes por grupos de edad según tipo de droga que motiva el tratamiento

Tipo de droga que motiva el tratamiento	Grupos de edad del entrevistado							Total
	Hasta 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 o más	
Alcohol	1.9	10.5	13.0	12.4	8.7	10.5	42.9	100
Tabaco	2.4	9.8	19.5	4.9	9.8	19.5	34.1	100
Solventes o inhalables	29.2	54.5	8.9	4.9	1.6	0.8		100
Marihuana	3.2	40.6	31.3	13.3	5.8	3.4	2.4	100
Cocaínas	1.1	21.6	24.1	21.7	16.4	8.8	6.3	100
Tranquilizantes	1.8	20.4	16.7	10.5	8.6	11.1	30.9	100

Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

## Tratamientos- distribución de los pacientes por sexo según grupos de edad



Fuente: Segunda fase del registro continuo de paciente en tratamiento- 2005

# Tratamiento

- Demanda de tratamiento más alta en rango de 25 a 34 años
- Promedio de accesibilidad a tratamiento 75%, con picos de 97% en 18 a 24 y valles de 53% en 12 a 17
- Sustancias que motivan el tratamiento de manera mayoritaria: hasta 24 años solvente e ilegales; más de 35 drogas legales y a partir de 40 se suman tranquilizantes
- En varones alcohol, marihuana y cocaína; en mujeres alcohol, tranquilizantes y cocaína.
- El alcohol, la marihuana y las cocaínas concentran el 83,4% de las sustancias originarias de tratamiento.

# Tratamiento

- El **32.4%** de los pacientes en tratamiento lo están por **alcoholismo**
- En segundo lugar, por **consumo de marihuana (25.8%)**,
- En tercer y cuarto lugar, por consumo de cocaínas: **clorhidrato de cocaína el 18.7%** y **pasta base el 6.4%**.
- Por consumo de solventes o **inhalables está el 5.5%** de los pacientes y por consumo de **tranquilizantes un 7%**.

## Uso de drogas y delito en detenidos recientes

- El **44.1% mostró relación** entre el consumo de drogas y la comisión del delito o contravención.
- La sustancia de mayor presencia en el consumo es el **alcohol (82.7%)**, seguido por **inhalables (9.3%)**, **marihuana (4.6%)**, **tranquilizantes (3.5%)** y **cocaínas (1.2%)**.
- La mitad de los casos de detención tuvieron relación al consumo, entre las contravenciones, **el 78.4%** y del total de medidas de resguardo, el **52.5%**.

Fuente: El uso indebido de drogas y su relación con la comisión de delitos - 2004

## Uso de drogas y delito en personas alojadas en establecimientos carcelarios

- El **75.6%** respondió haber consumido alguna vez marihuana, el **68.1%** cocaína, el **64.5%** psicofármacos, el **49.5%** inhalables y el **20.3%** pasta base.
- El **14.7%** declara haber estado bajo el efecto de alcohol y **drogas** cuando cometió el primer delito, y el **25%** declara haberlo estado cuando cometió el delito por el que están detenidos
- El **17.5%** de los que cometieron homicidios, el **28.1%** de los **asaltos a mano armada** y el **32.4%** de **robos** declararon estar bajo el efecto de alcohol y drogas.

Fuente: Estudio piloto en población privada de la libertad en dos unidades penitenciarias del país - 2006

# Uso de drogas y lesionados en salas de emergencia de hospitales públicos

- El **8.2% de las consultas de emergencia**, está relacionado con consumo de sustancias.
- La sustancia que tiene mayor prevalencia de consumo en las últimas 6 horas anteriores al ingreso a la guardia es **el alcohol, seguido de tranquilizantes y sedantes, marihuana y cocaínas.**
- La presencia del alcohol en las consultas relacionadas al consumo de droga es del **80.5%**.
- Le siguen la **marihuana con un 9.2%**, y los **tranquilizantes con 9 %**. junto a sedantes y sustancias afines
- **El 24,1% ingreso inconsciente o con conmoción cerebral** frente al 2.8% que registraron las consultas que no tienen relación con el consumo.

Están asociados al consumo de alguna sustancia:

- El **70.5% de los ingresos por intentos de suicidio**
- El **47.6% de los ingresos por situaciones de violencia**
- El **17.3% de los ingresos por accidentes de tránsito**

Fuente: El uso indebido de drogas y la consulta de emergencia - 2005

# Gastos gubernamentales – Año 2004

Gobierno	Tabaco	Alcohol	Ilegales	Total
Nacional	1.681.564	126.689.792	139.569.091	267.940.447
Locales	0	730.603.905	435.249.482	1.165.853.387
Totales	1.681.564	857.293.697	574.818.573	1.433.793.834
En %	0.1	59.8	40.1	100.0


Fuente: Estudio de costos sociales y económicos sobre el uso de sustancias en Argentina  
( en elaboración)

# Gastos gubernamentales – Año 2004


Gobierno	Reducción de Demanda	Reducción de Oferta	Total
Nacional	32.159.673	235.780.775	267.940.447
Locales	32.315.240	1.133.538.147	1.165.853.387
Totales	64.474.913	1.369.318.922	1.433.793.834
En %	4.5	95.5	100.0

Fuente: Estudio de costos sociales y económicos sobre el uso de sustancias en Argentina  
( en elaboración)


Por reducción de oferta y de demanda




Por tipo de sustancia



Por nivel



Por poderes



## Defunciones asociadas al uso de sustancias psicoactivas – Año 2004

- Alcohol: 8.523
- Tabaco: 39.978
- Drogas ilegales o de uso indebido: 320
  
- Total: 48.821

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación

# Reflexiones acerca de la asignación de recursos gubernamentales

- Estamos en el camino correcto con este esquema de asignación de recursos?
- Es posible enfrentar los problemas identificados con estos niveles de inversión pública?
- De no ser sí, cómo convencer a los decisores de la necesidad de invertir en el sector?

# Desafíos

- Fortalecer las estrategias preventivas, dotándolas de una mirada de largo plazo.
- Aumentar los niveles de coordinación intergubernamental y entre los diferentes niveles de gobierno, de modo de presentar estrategias y acciones integradas, atendiendo a la multicausalidad del problema.
- Articular una estrategia asistencial nacional que garantice niveles óptimos de accesibilidad a las demandas de tratamiento
- Enfatizar las intervenciones vinculadas con el uso y abuso de alcohol ( regímenes de expendio, política tributaria, publicidad, etc.)

# Desafíos

- Incrementar la capacidad de respuesta a nivel técnico, a través de formación de recursos humanos y aplicación de herramientas de calidad.
- Desarrollar mecanismos ágiles que permitan fomentar sistemas de evaluación en las acciones preventivas y asistenciales.
- Promover esquemas de gestión sustentables que involucren no solo la disponibilidad de recursos sino la gestión de criterios de institucionalidad de la política.